

**Enfermedad: Repilo (Spilocaea oleagina).**

Se comunica a los agricultores que las condiciones de temperatura y humedad son las idóneas para que se desarrolle esta enfermedad y por lo tanto se recomienda realizar tratamientos preventivos con compuestos cúpricos, también es recomendable añadir un abono rico en potasio (nitrato potásico 1.5%-2%) con dosis según fabricante.



- Zona de actuación: zonas bajas, cercanas a los ríos y arroyos, zonas de nieblas persistentes, zonas con repilo persistente.

Se recomienda mojar bien el olivo, principalmente en las zonas bajas y del interior del árbol.

- Materias activas recomendadas:

(Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Departamento de Sanidad Vegetal.)

Preventivos: (dosis según fabricante)

Oxicloruro de cobre.  
Hidróxido cúprico.  
Óxido cuproso.  
Sulfato cuprocálcico.  
Tebuconazol.  
Mancoceb + cobre.

Preventivos/curativos: (dosis según fabricante)

Difenoconazol.

Para resolución de dudas, visita de su explotación o para recibir en su correo electrónico de forma periódica los boletines informativos, los técnicos de Atrias se encuentran a su disposición en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Segura. Tlf:953486063. Fax: 953486473 e-mail: [tecnico1@dosierradesegura.com](mailto:tecnico1@dosierradesegura.com).